

## 2) エンブレル : 当クリニックにおける使用状況 (30年8月現在)

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
1) 40代 / 女 / 15年 / IV / 3	MTX,Lef	10→2 (mg/日)	7.21→0.06 (mg/dl)	著効
2) 50代 / 男 / 25年 / IV / 2	MTX,SASP,BUC	10→5 (mg/日)	5.30→0.45 (mg/dl)	有効
3) 20代 / 女 / 12年 / IV / 2	MTX	10 →0 (mg/日)	2.86→0.28 (mg/dl)	著効
4) 60代 / 女 / 20年 / IV / 2	SASP	10→2.5 (mg/日)	10.88→1.26 (mg/dl)	有効(無効化)
5) 60代 / 女 / 15年 / III / 2	MTX	5→2.5 (mg/日)	0.87→0.08 (mg/dl)	著効(無効化)
6) 60代 / 男 / 14年 / IV / 2	SASP	10→5 (mg/日)	12.65→0.56 (mg/dl)	有効(無効化)
7) 80代 / 女 / 2年 / IV / 3	MTX	7.5→7.5 (mg/日)	14.00→0.32 (mg/dl)	有効
8) 40代 / 男 / 5年 / IV / 1	MTX,SASP	7.5→5 (mg/日)	3.21→1.56 (mg/dl)	有効
9) 60代 / 女 / 8年 / III / 2	SASP,Az	10 →2.5 (mg/日)	1.22→0.25 (mg/dl)	著効(無効化)
10) 60代 / 男 / 3年 / III / 2	MTX,SASP	5→0 (mg/日)	2.20→0.22 (mg/dl)	著効
11) 70代 / 女 / 27年 / IV / 3	MTX,BUC	5 →0 (mg/日)	0.15→0.03 (mg/dl)	著効
12) 70代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX,SASP,Lef,Az	10 →0 (mg/日)	5.60→0.24 (mg/dl)	著効
13) 70代 / 女 / 30年 / IV / 3	MTX	10→5 (mg/日)	1.53→0.87 (mg/dl)	有効
14) 60代 / 女 / 23年 / IV / 2	MTX,BUC	7.5 →0 (mg/日)	0.45→0.15 (mg/dl)	著効
15) 60代 / 女 / 6年 / III / 2	ヒュミラ	5→5 (mg/日)	0.04→0.06 (mg/dl)	有効
16) 50代 / 女 / 30年 / IV / 3	MTX,SASP,BUC	5→0 (mg/日)	4.78→0.30 (mg/dl)	著効
17) 60代 / 男 / 4年 / III / 2	MTX,SASP,BUC,Az	10→0 (mg/日)	4.21→0.27 (mg/dl)	著効
18) 10代 / 女 / 11年 / IV / 1	MTX,SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.40→0.03 (mg/dl)	著効(無効化)
19) 60代 / 女 / 30年 / IV / 3	BUC	2.5→0 (mg/日)	0.45→0.22 (mg/dl)	著効(無効化)
20) 60代 / 女 / 17年 / III / 2	MTX,SASP	0→0 (mg/日)	0.82→0.21 (mg/dl)	著効(無効化)
21) 20代 / 女 / 20年 / IV / 3	SASP,BUC,Met	5→0 (mg/日)	1.10→0.09 (mg/dl)	著効
22) 60代 / 女 / 6年 / III / 2	なし	10 →0 (mg/日)	2.40→0.15 (mg/dl)	著効(無効化)
23) 20代 / 女 / 7年 / IV / 2	Lef	5→2.5 (mg/日)	1.90→0.11 (mg/dl)	著効
24) 70代 / 女 / 25年 / IV / 3	SASP,BUC	5→2.5 (mg/日)	2.30→0.03 (mg/dl)	著効
25) 40代 / 女 / 10年 / III / 1	MTX	0→0 (mg/日)	0.72→0.15 (mg/dl)	著効
26) 60代 / 女 / 30年 / IV / 3	なし	5→2.5 (mg/日)	2.83→0.20 (mg/dl)	著効
27) 30代 / 女 / 6年 / IV / 2	MTX,SASP	5 →0 (mg/日)	1.60→0.15 (mg/dl)	著効
28) 60代 / 女 / 5年 / IV / 2	MTX,SASP,BUC,Met	5 →0 (mg/日)	4.23→1.01 (mg/dl)	著効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
29)50代 / 男 / 20年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	5→5 (mg/日)	1.50→0.10 (mg/dl)	有効
30)40代 / 女 / 18年 / IV / 2	MTX, BUC	5 →0 (mg/日)	3.25→0.03 (mg/dl)	著効
31)60代 / 女 / 22年 / III / 2	MTX, Tac	7.5 →0 (mg/日)	0.71→0.15 (mg/dl)	著効
32)50代 / 女 / 9年 / III / 2	MTX,SASP,BUC,Met,ヒュミラ	7.5→2.5 (mg/日)	0.16→0.30 (mg/dl)	著効
33)80代 / 女 / 20年 / IV / 3	なし	5→5 (mg/日)	0.89→0.03 (mg/dl)	有効
34)60代 / 男 / 6年 / III / 2	MTX, レミケード	5 →0 (mg/日)	1.00→0.11 (mg/dl)	著効
35)60代 / 女 / 7年 / III / 2	Lef	0→0 (mg/日)	1.96→0.09 (mg/dl)	著効
36)60代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX	2.5→2.5 (mg/日)	4.00→2.92 (mg/dl)	無効
37)60代 / 男 / 5年 / II / 2	MTX, BUC	5 →0 (mg/日)	2.50→0.06 (mg/dl)	著効
38)20代 / 女 / 5年 / I / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.07→0.11 (mg/dl)	無効
39)60代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	1.14→0.06 (mg/dl)	著効
40)40代 / 女 / 2年 / II / 1	MTX,SASP,BUC	5 →0 (mg/日)	0.36→0.01 (mg/dl)	著効
41)50代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	5→5 (mg/日)	3.30→0.02 (mg/dl)	有効
42)30代 / 女 / 7か月 / I / 2	MTX	0 →0 (mg/日)	5.91→2.90 (mg/dl)	無効
43)40代 / 女 / 3年 / II / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.73→0.21 (mg/dl)	著効
44)60代 / 女 / 30年 / IV / 3	MTX	2.5 →0 (mg/日)	1.10→0.10 (mg/dl)	著効
45)30代 / 女 / 6年 / IV / 2	MTX,SASP,BUC	2.5→2.5 (mg/日)	0.10→0.08 (mg/dl)	有効
46)50代 / 女 / 12年 / IV / 3	MTX、ヒュミラ	5→3.75 (mg/日)	0.02→0.06 (mg/dl)	有効
47)80代 / 女 / 24年 / IV / 3	BUC	0→0 (mg/日)	22.14→ 0.50 (mg/dl)	有効
48)70代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX, Met	0→0 (mg/日)	0.05→0.02 (mg/dl)	著効
49)30代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX	5 →0 (mg/日)	1.31→0.11 (mg/dl)	著効
50)20代 / 女 / 2年 / III / 3	MTX	0→0 (mg/日)	3.13→0.10 (mg/dl)	著効
51)50代 / 女 / 22年 / III / 2	MTX	2.5→2 (mg/日)	0.61→0.04 (mg/dl)	著効
52)40代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX、レミケード	0→0 (mg/日)	0.11→0.10 (mg/dl)	著効
53)60代 / 女 / 6年 / III / 2	なし	2.5→2.5 (mg/日)	0.05→0.01 (mg/dl)	有効
54)20代 / 女 / 2年 / I / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	著効
55)30代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX、ヒュミラ	0→0 (mg/日)	1.30→0.05 (mg/dl)	著効
56)30代 / 女 / 2年 / III / 2	なし	0→0 (mg/日)	0.02→0.02 (mg/dl)	著効
57)40代 / 女 / 1カ月 / I / 3	SASP	0→0 (mg/日)	0.40→0.20 (mg/dl)	著効
58)40代 / 女 / 4年 / III / 2	SASP,BUC	2.5→2.5 (mg/日)	0.02→0.02 (mg/dl)	有効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
59)30代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX, BUC	0→0 (mg/日)	0.60→0.10 (mg/dl)	著効
60)40代 / 女 / 23年 / III / 3	MTX, ヒュミラ	0→0 (mg/日)	0.23→0.05 (mg/dl)	著効
61)60代 / 女 / 11年 / III / 2	ヒュミラ	10→10 (mg/日)	0.03→0.02 (mg/dl)	有効
62)70代 / 男 / 2年 / I / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.10→0.08 (mg/dl)	著効
63)60代 / 男 / 4年 / III / 2	MTX, SASP, アラバ	5→5 (mg/日)	6.30→0.30 (mg/dl)	有効
64)50代 / 男 / 3か月 / I / 2	なし	0→0 (mg/日)	0.01→0.01 (mg/dl)	判定不能
65)50代 / 女 / 7か月 / I / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.10→0.05 (mg/dl)	著効
66)70代 / 女 / 10年 / III / 2	アラバ	0→0 (mg/日)	0.17→0.09 (mg/dl)	著効
67)40代 / 男 / 2年 / III / 3	MTX	0→0 (mg/日)	0.50→0.05 (mg/dl)	著効
68)40代 / 女 / 4年 / I / 2	SASP	0→0 (mg/日)	0.02→0.09 (mg/dl)	著効
69)40代 / 女 / 6年 / I / 2	MTX, BUC, オレンシア	0→0 (mg/日)	0.10→0.05 (mg/dl)	判定不能
70)70代 / 女 / 17年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.84→0.52 (mg/dl)	判定不能
71)30代 / 女 / 20年 / IV / 3	ヒュミラ	0→0 (mg/日)	0.52→0.12 (mg/dl)	著効
72)60代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	2.20→0.15 (mg/dl)	著効
73)50代 / 女 / 23年 / IV / 3	MTXLef, オレンシア	3→1 (mg/日)	0.90→0.03 (mg/dl)	著効
74A)60代 / 女 / 6年 / III / 3	MTX	0→0 (mg/日)	5.56→0.10 (mg/dl)	著効
75)60代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX, BUC	0→0 (mg/日)	0.08→0.08 (mg/dl)	著効
76)80代 / 女 / 3か月 / I / 2	MTX	10→2 (mg/日)	0.21→0.02 (mg/dl)	著効
77)70代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX, シムジア	0→0 (mg/日)	0.84→0.12 (mg/dl)	有効
78)20代 / 女 / 8年 / IV / 2	MTX	0→0 (mg/日)	不明→0.10 (mg/dl)	著効
79)60代 / 女 / 3か月 / I / 3	MTX, BUC	5→0 (mg/日)	1.30→0.11 (mg/dl)	著効
80)70代 / 男 / 13年 / IV / 3	SASP	5→2.5 (mg/日)	0.40→0.02 (mg/dl)	著効
81)60代 / 女 / 40年 / IV / 2	MTX	0→0 (mg/日)	2.15→0.01 (mg/dl)	著効
82)80代 / 女 / 2年 / III / 3	なし	0→0 (mg/日)	5.33→0.28 (mg/dl)	有効
83)70代 / 女 / 5年 / III / 3	MTX, BUC, SASP	5→3 (mg/日)	1.85→0.05 (mg/dl)	著効
84)70代 / 男 / 29年 / IV / 2	MTX, SASP	0→0 (mg/日)	0.40→0.10 (mg/dl)	著効
85)30代 / 女 / 2年 / I / 2	なし	0→0 (mg/日)	不明→0.11 (mg/dl)	著効
86)70代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX, SASP	0→0 (mg/日)	0.70→0.20 (mg/dl)	著効
87)60代 / 男 / 6か月 / I / 2	MTX	0→0 (mg/日)	1.82→0.10 (mg/dl)	著効
88)30代 / 女 / 1年 / III / 2	なし	0→0 (mg/日)	0.07→0.03 (mg/dl)	著効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
89)70代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX,BUC	0→0 (mg/日)	4.62→0.21 (mg/dl)	著効
90)30代 / 女 / 1年 / I / 3	なし	0→0 (mg/日)	3.12→0.06 (mg/dl)	著効
91)50代 / 女 / 1年 / I / 3	なし	0→0 (mg/日)	0.08→0.07 (mg/dl)	無効
92)70代 / 男 / 10年 / III / 2	ケアラム	0→0 (mg/日)	6.70→4.56 (mg/dl)	無効
93)70代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX,SASP	2→0 (mg/日)	0.02→0.01 (mg/dl)	著効
94)70代 / 女 / 13年 / IV / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.30→0.01 (mg/dl)	著効
95)40代 / 男 / 6年 / II / 2	MTX,SASP,BUC	0→5 (mg/日)	2.10→2.01 (mg/dl)	有効
96)70代 / 男 / 5年 / II / 2	MTX,BUC	0→0 (mg/日)	0.51→ 0.10 (mg/dl)	著効
97)70代 / 男 / 3か月 / I / 3	MTX,BUC	0→0 (mg/日)	3.20→0.64 (mg/dl)	有効
98)70代 / 女 / 11年 / VI / 3	ブレディニン	7→5 (mg/日)	2.82→0.01 (mg/dl)	著効
99)30代 / 女 / 6年 / III / 2	SASP	15→0 (mg/日)	1.30→0.01 (mg/dl)	著効
100)30代 / 女 / 2年 / III / 2	BUC	0→0 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	著効
101)80代 / 男 / 1年 / I / 2	なし	0→0 (mg/日)	0.06→0.04 (mg/dl)	有効
102)30代 / 女 / 13年 / III / 2	SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.05→ 0.04 (mg/dl)	著効
103)70代 / 女 / 7年 / II / 2	MTX,SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.02→0.04 (mg/dl)	著効
104)70代 / 男 / 7年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.10→0.09 (mg/dl)	無効
105)80代 / 女 / 5か月 / I / 2	MTX	5→0.5 (mg/日)	1.71→0.02 (mg/dl)	著効
106)50代 / 女 / 13年 / II / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.89→0.06 (mg/dl)	著効
107)70代 / 男 / 2年 / II / 2	MTX,SASP	0→0 (mg/日)	0.08→0.07 (mg/dl)	有効
108)70代 / 女 / 8年 / III / 2	BUC、インフリキシマブ	10→10 (mg/日)	3.21→4.86 (mg/dl)	無効
109)60代 / 女 / 7年 / II / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.10→0.02 (mg/dl)	有効
110)20代 / 女 / 7年 / III / 2	MTX,SASP,ケアラム	0→0 (mg/日)	0.17→0.11 (mg/dl)	著効
111)40代 / 女 / 1年 / III / 2	なし	0→0 (mg/日)	0.23→0.12 (mg/dl)	著効
112)60代 / 女 / 4年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.30→2.11 (mg/dl)	無効
113)70代 / 女 / 7年 / III / 3	MTX	5→2.5 (mg/日)	5.39→0.12 (mg/dl)	著効
114)30代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.02→0.03 (mg/dl)	著効
115)50代 / 女 / 5年 / III / 2	MTX	1→1 (mg/日)	1.50→0.05 (mg/dl)	有効
116)80代 / 女 / 11年 / III / 2	MTX、インフリキシマブ	5→5 (mg/日)	3.69→4.28 (mg/dl)	無効
117)60代 / 女 / 6か月 / I / 3	MTX,アクテムラ	0→0 (mg/日)	0.34→0.02 (mg/dl)	著効
118)60代 / 女 / 11年 / III / 2	MTX、SASP,ケアラム	2.5→0 (mg/日)	3.95→0.28 (mg/dl)	著効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
119)80代 / 女 / 8か月 / III / 2	なし	0→0 (mg/日)	1.48→0.03 (mg/dl)	著効
120)30代 / 女 / 11年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	1.27→0.08 (mg/dl)	著効
121)80代 / 女 / 2年 / I / 3	SASP	0→0 (mg/日)	1.07→0.09 (mg/dl)	有効
122)70代 / 女 / 6か月 / II / 2	MTX,BUC	1→0 (mg/日)	1.20→0.08 (mg/dl)	著効
123)80代 / 女 / 1年 / III / 2	SASP、ヒュミラ	5→2 (mg/日)	6.97→2.72 (mg/dl)	有効
124)30代 / 女 / 9年 / III / 2	シンポニー	0→0 (mg/日)	1.98→0.49 (mg/dl)	有効
125)70代 / 女 / 6か月 / I / 2	MTX,SASP	0→0 (mg/日)	0.60→0.05 (mg/dl)	著効
126)40代 / 女 / 4か月 / I / 3	MTX	0→0 (mg/日)	7.60→ 0.21 (mg/dl)	著効
127)40代 / 女 / 5年 / III / 2	MTX,SASP	0→0 (mg/日)	1.40→0.08 (mg/dl)	著効

MTX:メトレート、リウマトレックス、SASP:アザルフィジン、BUC:リマチル、Met:メタルカプターゼ、Ex:エンドキサン、Tac:プログラフ、Az:イムラン、CyA:ネオオーラル、Gold:シオゾール、Lef:アラバ、PSL:プレドニゾロン