

# 3) アクテムラ : 当クリニックにおける使用状況 (令和1年8月現在)

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
1) 60代 / 女 / 20年 / IV / 3	MTX	10 → 0 (mg/日)	13.21 → (mg/dl)	著効
2) 60代 / 男 / 2年 / II / 1	MTX,SASP	5 → 0 (mg/日)	1.56 → (mg/dl)	著効
3) 50代 / 男 / 7年 / III / 2	MTX,SASP,BUC,Lef,レミケード	15 → 7.5 (mg/日)	12.56 → (mg/dl)	著効
4) 70代 / 女 / 12年 / IV / 3	なし	5 → 2.5 (mg/日)	9.97 → (mg/dl)	著効
5) 50代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX,SASP	5 → 0 (mg/日)	0.90 → (mg/dl)	有効
6) 10代 / 女 / 3年 / II / 1	MTX,ヒュミラ	5 → 0 (mg/日)	2.76 → (mg/dl)	著効
7) 70代 / 女 / 15年 / III / 2	MTX,エンブレル	2.5 → 2.5 (mg/日)	0.20 → (mg/dl)	有効
8) 60代 / 女 / 20年 / IV / 2	MTX	10 → 0 (mg/日)	4.59 → (mg/dl)	著効
9) 60代 / 男 / 20年 / IV / 3	SASP,ヒュミラ	5 → 0 (mg/日)	6.25 → (mg/dl)	著効
10) 50代 / 女 / 2年 / II / 2	MTX	10 → 0 (mg/日)	2.02 → (mg/dl)	著効
11) 60代 / 女 / 17年 / IV / 2	ヒュミラ	10 → 10 (mg/日)	12.22 → (mg/dl)	著効
12) 40代 / 女 / 19年 / IV / 2	MTX,レミケード	5 → 1.25 (mg/日)	3.1 → (mg/dl)	著効
13) 30代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX,エンブレル	5 → 0 (mg/日)	不明 → (mg/dl)	著効
14) 60代 / 女 / 11年 / IV / 2	SASP,BUC	5 → 2.5 (mg/日)	6.50 → (mg/dl)	著効
15) 50代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX,レミケード	5 → 0 (mg/日)	2.22 → (mg/dl)	著効
16) 60代 / 女 / 9年 / III / 2	MTX,SASP、レミケード	5 → 0 (mg/日)	2.91 → (mg/dl)	著効
17) 50代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX,レミケード	5 → 0 (mg/日)	4.60 → (mg/dl)	著効
18) 60代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX,ヒュミラ	2.5 → 0 (mg/日)	7.02 → (mg/dl)	著効
19) 40代 / 女 / 8年 / III / 1	MTX	5 → 0 (mg/日)	不明 → (mg/dl)	著効
20) 60代 / 女 / 27年 / IV / 2	MTX,レミケード	2 → 1 (mg/日)	4.31 → (mg/dl)	無効
21) 60代 / 男 / 11年 / II / 2	レミケード	10 → 1 (mg/日)	12.43 → (mg/dl)	著効
22) 40代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX	0 → 0 (mg/日)	0.03 → (mg/dl)	著効
23) 70代 / 女 / 1年 / I / 3	MTX	10 → 10 (mg/日)	1.01 → (mg/dl)	判定不能
24) 60代 / 女 / 1年 / I / 2	MTX	0 → 0 (mg/日)	2.24 → (mg/dl)	著効
25) 50代 / 女 / 5年 / III / 2	MTX	6 → 3 (mg/日)	0.18 → (mg/dl)	著効
26) 50代 / 女 / 7年 / III / 2	MTX	10 → 1.25 (mg/日)	0.03 → (mg/dl)	著効
27) 50代 / 女 / 13年 / III / 3	MTX、オレンシア	5 → 3.75 (mg/日)	0.03 → (mg/dl)	著効
28) 20代 / 女 / 15年 / IV / 2	MTX、ヒュミラ	0 → 0 (mg/日)	2.00 → (mg/dl)	著効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
29)40代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX、オレンシア	5→2.5 (mg/日)	0.32→ (mg/dl)	著効
30)30代 / 女 / 8年 / IV / 2	MTX、オレンシア	2.5 →0 (mg/日)	0.23→ (mg/dl)	著効
31)40代 / 女 / 21年 / III / 2	MTX、オレンシア	3.75 →0 (mg/日)	0.28→ (mg/dl)	著効
32)60代 / 女 / 11年 / III / 2	エンブレル	10→7.5 (mg/日)	0.18→ (mg/dl)	有効
33)50代 / 女 / 12年 / III / 2	MTX、エンブレル	2.5→2.5 (mg/日)	0.02→ (mg/dl)	有効
34)60代 / 女 / 7年 / III / 2	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	著効
35)70代 / 女 / 15年 / III / 2	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	4.28→ (mg/dl)	有効
36)40代 / 女 / 21年 / IV / 2	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	0.20→ (mg/dl)	著効
37)60代 / 女 / 4年 / III / 2	MTX,SASP,BUC,オレンシア	2.5→1.25 (mg/日)	0.09→ (mg/dl)	著効
38)50代 / 女 / 23年 / IV / 2	MTX、ヒュミラ	0→0 (mg/日)	0.04→ (mg/dl)	著効
39)50代 / 女 / 6年 / IV / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	著効
40)60代 / 男 / 5年 / III / 2	MTX、Lef、SASP、エンブレル	5→5 (mg/日)	0.50→ (mg/dl)	有効
41)60代 / 女 / 20年 / III / 2	MTX、Lef、オレンシア	5→5 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	有効
42)70代 / 女 / 4年 / III / 2	MTX、レミケード	0→0 (mg/日)	不明→ (mg/dl)	著効
43)50代 / 女 / 1年 / III / 3	MTX	5 →0 (mg/日)	14.20→ (mg/dl)	著効
44)30代 / 女 / 10年 / IV / 3	MTX	0→0 (mg/日)	1.12→ (mg/dl)	著効
45)20代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX、BUC	0→0 (mg/日)	1.00→ (mg/dl)	著効
46)40代 / 女 / 21年 / IV / 2	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	0.15→ (mg/dl)	有効
47)60代 / 女 / 4年 / III / 2	MTX、エンブレル	0→0 (mg/日)	3.57→ (mg/dl)	著効
48)60代 / 女 / 14年 / IV / 3	なし	0→0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	有効
49)70代 / 女 / 35年 / IV / 2	MTX、エンブレル	0→0 (mg/日)	1.05→ (mg/dl)	有効
50)60代 / 女 / 22年 / III / 2	MTX,SASP,BUC,エンブレル	0→0 (mg/日)	0.50→ (mg/dl)	著効
51)70代 / 男 / 10年 / III / 2	エンブレル	0→0 (mg/日)	4.56→ (mg/dl)	著効
52)50代 / 女 / 1年 / I / 2	MTX、エンブレル	0→0 (mg/日)	0.07→ (mg/dl)	有効
53)40代 / 女 / 5年 / III / 2	MTX、レミケード	5→5 (mg/日)	0.03→ (mg/dl)	有効
54)40代 / 女 / 1年 / III / 3	MTX,BUC	0→0 (mg/日)	4.80→ (mg/dl)	著効
55)30代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	著効
56)20代 / 女 / 5年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	2.00→ (mg/dl)	有効
57)30代 / 女 / 2年 / I / 2	SASP	0→0 (mg/日)	0.20→ (mg/dl)	著効
58)40代 / 女 / 11年 / IV / 2	MTX,エンブレル	0→0 (mg/日)	1.60→ (mg/dl)	無効
59)50代 / 女 / 5年 / I / 2	MTX,SASP	0→0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	著効
60)50代 / 女 / 12年 / IV / 2	オレンシア、MTX	1→1 (mg/日)	0.60→ (mg/dl)	有効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
61)60代 / 女 / 3年 / III / 2	ケアラム	0→0 (mg/日)	0.62→ (mg/dl)	著効
62)50代 / 女 / 12年 / IV / 2	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	0.23→ (mg/dl)	有効
63)40代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.30→ (mg/dl)	有効
64)50代 / 女 / 7年 / IV / 3	MTX	0→0 (mg/日)	8.50→ (mg/dl)	著効
65)20代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX、BUC	0→0 (mg/日)	0.02→ (mg/dl)	著効
66)60代 / 女 / 4年 / III / 2	MTX、SASP,BUC	10→10 (mg/日)	0.40→ (mg/dl)	無効
67)20代 / 女 / 1年 / II / 2	なし	0→0 (mg/日)	1.24→ (mg/dl)	著効
68)50代 / 女 / 8年 / III / 3	ケアラム、SASP	0→0 (mg/日)	1.89→ (mg/dl)	著効
69)40代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.12→ (mg/dl)	判定不能
70)50代 / 女 / 6年 / IV / 3	MTX、BUC、ケアラム	0→0 (mg/日)	1.70→ (mg/dl)	著効
71)40代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.15→ (mg/dl)	有効
72)50代 / 女 / 9年 / III / 3	MTX、SASP、ケアラム	2.5→0 (mg/日)	1.00→ (mg/dl)	著効
73)60代 / 男 / 1年 / I / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.50→ (mg/dl)	著効
74)10代 / 女 / 1年 / I / 3	MTX	10→0 (mg/日)	4.60→ (mg/dl)	著効
75)60代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX、SASP	0→0 (mg/日)	0.40→ (mg/dl)	著効
76)80代 / 男 / 38年 / III / 3	SASP,BUC、シンポニ	5→0 (mg/日)	3.78→ (mg/dl)	著効
77)50代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.30→ (mg/dl)	有効
78)50代 / 女 / 3年 / II / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	3.28→ (mg/dl)	著効
79)50代 / 女 / 3年 / III / 3	MTX、BUC、ケアラム	0→0 (mg/日)	0.06→ (mg/dl)	著効
80)70代 / 女 / 1年 / I / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.62→ (mg/dl)	著効
81)30代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	著効
82)20代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX、SASP	2→0 (mg/日)	0.19→ (mg/dl)	著効
83)30代 / 男 / 10年 / III / 2	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	有効
84)40代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX、エンブレル	0→0 (mg/日)	0.02→ (mg/dl)	著効
85)50代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	2.20→ (mg/dl)	著効
86)30代 / 女 / 7年 / III / 2	MTX、BUC、ケアラム	0→0 (mg/日)	1.03→ (mg/dl)	著効
87)60代 / 女 / 1年 / III / 2	ヒュミラ	7.5→7.5 (mg/日)	5.87→ (mg/dl)	有効
88)60代 / 女 / 7年 / III / 2	ケアラム	0→0 (mg/日)	0.31→ (mg/dl)	著効
89)50代 / 女 / 8年 / III / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.20→ (mg/dl)	著効
90)50代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX、SASP,BUC	0→0 (mg/日)	0.13→ (mg/dl)	有効
91)70代 / 女 / 3年 / III / 2	シンポニー	5→5 (mg/日)	5.62→ (mg/dl)	有効
92)60代 / 女 / 4年 / III / 2	MTX、SASP,BUC、エンブレル	0→0 (mg/日)	0.40→ (mg/dl)	無効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
93)40代 / 女 / 15年 / III / 2	MTX, SASP,BUC	0 →0 (mg/日)	0.30→ (mg/dl)	著効
94)40代 / 男 / 8年 / IV / 3	MTX, SASP,BUC、インフリキシマブ	0→0 (mg/日)	3.05→ (mg/dl)	著効
95)60代 / 女 / 3か月 / I / 2	MTX	0→0 (mg/日)	2.00→ (mg/dl)	無効
96)40代 / 女 / 8年 / III / 2	MTX, SASP	0 →0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	著効
97)60代 / 女 / 1年 / I / 2	MTX, BUC	0→0 (mg/日)	0.07→ (mg/dl)	著効
98)40代 / 男 / 9年 / III / 2	MTX, SASP,BUC	0 →0 (mg/日)	1.67→ (mg/dl)	有効
99)40代 / 女 / 4年 / III / 3	MTX, SASP,BUC	0→0 (mg/日)	2.32→ (mg/dl)	著効
100)60代 / 女 / 7年 / III / 3	MTX, SASP,BUC	0→0 (mg/日)	1.31→ (mg/dl)	著効
101)40代 / 男 / 11年 / III / 2	MTX	0 →0 (mg/日)	5.23→ (mg/dl)	著効
102)30代 / 女 / 7年 / III / 2	MTX, SASP	0→0 (mg/日)	1.16→ (mg/dl)	著効
103)80代 / 女 / 11年 / III / 2	MTX, エンブレル	5→5 (mg/日)	3.87→ (mg/dl)	有効
104)40代 / 女 / 28年 / IV / 3	MTX	0→0 (mg/日)	12.75→ (mg/dl)	著効
105)50代 / 女 / 1年 / III / 3	なし	0→0 (mg/日)	0.61→ (mg/dl)	有効
106)40代 / 女 / 2年 / III / 2	エタネルセプトMTX, ケアラム	0 →0 (mg/日)	0.10→ (mg/dl)	有効
107)30代 / 女 / 5年 / III / 3	エタネルセプト、SASP	0 →0 (mg/日)	0.70→ (mg/dl)	著効

MTX:メトレート、リウマトレックス、SASP:アザルフィジン、BUC:リマチル、Met:メタルカプターゼ、Ex:エンドキサン、Tac:プログラフ、Az:イムラン、CyA:ネオオーラル、Gold:シオゾール、Lef:アラバ、PSL:プレドニゾロン