

5) オレンシア : 当クリニックにおける使用状況 (30年8月現在)

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
1) 70代 / 女 / 20年 / IV / 2	MTX,SASP	5→1.25 (mg/日)	3.63→0.06 (mg/dl)	著効
2) 50代 / 女 / 7年 / IV / 2	MTX、レミケード	5→2 (mg/日)	0.86→0.02 (mg/dl)	著効
3) 60代 / 女 / 18年 / IV / 2	アクテムラ	5→5 (mg/日)	→1.58 (mg/dl)	有効
4) 70代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.90→0.21 (mg/dl)	有効(無効化)
5) 70代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	0→0 (mg/日)	3.34→0.10 (mg/dl)	著効(無効化)
6) 40代 / 女 / 4年 / III / 3	MTX、エンブレル	0→0 (mg/日)	0.03→0.03 (mg/dl)	著効
7) 60代 / 女 / 8か月 / I / 2	MTX	5→2.5 (mg/日)	1.00→0.10 (mg/dl)	著効
8) 30代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX	5→0 (mg/日)	1.72→0.02 (mg/dl)	著効
9) 60代 / 女 / 6年 / III / 3	MTX、レミケード	2.5→0.3 (mg/日)	2.34→0.10 (mg/dl)	著効
10) 60代 / 女 / 13年 / IV / 3	MTX	7.5→2.5 (mg/日)	0.20→0.10 (mg/dl)	著効(無効化)
11) 40代 / 女 / 20年 / IV / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.70→0.10 (mg/dl)	著効
12) 40代 / 女 / 9年 / IV / 2	MTX	5→0 (mg/日)	1.52→0.10 (mg/dl)	著効
13) 30代 / 女 / 7年 / IV / 2	MTX、エンブレル	1.8→2.5 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	有効
14) 50代 / 男 / 6か月 / III / 3	MTX、BUC	0→0 (mg/日)	6.22→0.10 (mg/dl)	著効
15) 40代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.03→0.01 (mg/dl)	有効
16) 40代 / 女 / 5年 / I / 2	MTX、BUC	0→0 (mg/日)	0.03→0.03 (mg/dl)	有効
17) 70代 / 女 / 14年 / III / 2	MTX、アクテムラ	0→0 (mg/日)	→1.50 (mg/dl)	有効
18) 60代 / 女 / 27年 / IV / 2	MTX、アクテムラ	2→2 (mg/日)	→0.70 (mg/dl)	有効
19) 40代 / 女 / 20年 / III / 2	エンブレル	5→3.75 (mg/日)	1.06→0.06 (mg/dl)	著効
20) 60代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX、レミケード	3.75→2.5 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	著効
21) 80代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	1.50→0.20 (mg/dl)	著効
22) 70代 / 女 / 10か月 / III / 2	MTX,SASP	0→0 (mg/日)	0.20→0.15 (mg/dl)	著効
23) 50代 / 女 / 23年 / IV / 3	MTX,Lef,エンブレル	1→3 (mg/日)	0.10→0.90 (mg/dl)	無効
24) 40代 / 女 / 20年 / IV / 2	MTX	5→2 (mg/日)	0.70→0.06 (mg/dl)	著効
25) 60代 / 女 / 10年 / III / 1	MTX	5→1.1 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	著効
26) 80代 / 男 / 11年 / IV / 3	MTX,SASP	5→5 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	有効
27) 50代 / 女 / 13年 / IV / 3	MTX,エンブレル	5→5 (mg/日)	0.10→0.23 (mg/dl)	無効
28) 80代 / 女 / 23年 / IV / 2	なし	5→0.7 (mg/日)	0.08→0.10 (mg/dl)	著効

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
29)60代 / 女 / 7年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.20→0.01 (mg/dl)	著効(無効化)
30)40代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX,レミケード	5→5 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	有効(無効化)
31)60代 / 女 / 7年 / III / 2	なし	2.5→0 (mg/日)	0.06→0.21 (mg/dl)	著効
32)70代 / 女 / 6年 / III / 3	MTX,ヒュミラ	0→0 (mg/日)	0.18→1.26 (mg/dl)	無効
33)70代 / 女 / 2年 / I / 3	MTX	0→0 (mg/日)	1.01→0.74 (mg/dl)	無効
34)50代 / 女 / 5年 / III / 2	SASP,BUC,エンブレル	2.5→0 (mg/日)	0.10→0.13 (mg/dl)	著効(無効化)
35)80代 / 女 / 3年 / III / 3	BUC	0→0 (mg/日)	5.66→0.11 (mg/dl)	著効
36)60代 / 女 / 20年 / III / 2	MTX, Lef	5→5 (mg/日)	不明→0.36 (mg/dl)	無効
37)40代 / 女 / 21年 / IV / 2	MTX, ヒュミラ	0→0 (mg/日)	0.07→0.10 (mg/dl)	無効
38)30代 / 男 / 9年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	0.21→0.28 (mg/dl)	無効
39)40代 / 女 / 12年 / IV / 3	MTX, SASP,Lef,ヒュミラ	5→5 (mg/日)	3.78→4.56 (mg/dl)	無効

MTX:メトレート、リウマトレックス、SASP:アザルフィジン、BUC:リマチル、Met:メタルカプターゼ、Ex:エンドキサン、Tac:プログラフ、Az:イムラン、CyA:ネオオーラル、Gold:シオゾール、Lef:アラバ、PSL:プレドニゾロン