

# 1)レミケード(含インフリキシマブ)：当クリニックにおける使用状況(1年8月現在)

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
1)50代 / 女 / 5か月 / III / 3	MTX,SASP	20→2.5 (mg/日)	13.21→0.12 (mg/dl)	著効
2)50代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX,SASP,BUC	15→7.5 (mg/日)	5.30→0.15 (mg/dl)	著効
3)70代 / 女 / 8か月 / II / 2	MTX,SASP	20 →0 (mg/日)	1.56→0.03 (mg/dl)	著効
4)70代 / 女 / 10年 / IV / 2	MTX,SASP,Met	5→2.5 (mg/日)	3.56→0.22 (mg/dl)	著効
5)40代 / 男 / 2年(ベーチェット病)	Ex,Tac,Az	30→2 (mg/日)	0.35→0.09 (mg/dl)	著効
6)30代 / 女 / 10年(ベーチェット病)	CyA	40→0 (mg/日)	5.29→0.12 (mg/dl)	著効
7)20代 / 男 / 3年 / II / 1	MTX,SASP	20→2.5 (mg/日)	5.60→0.02 (mg/dl)	著効
8)60代 / 女 / 20年 / IV / 2	MTX	7.5→2.5 (mg/日)	2.11→0.09 (mg/dl)	著効
9)40代 / 女 / 16年 / IV / 3	MTX,SASP	7.5→7.5 (mg/日)	9.96→2.01 (mg/dl)	有効
10)50代 / 女 / 6年 / III / 2	MTX	5→0 (mg/日)	1.79→0.12 (mg/dl)	著効
11)20代 / 女 / 5年 / III / 2	MTX,SASP	0→0 (mg/日)	0.58→0.03 (mg/dl)	著効
12)50代 / 男 / 6年 / III / 2	MTX,SASP,BUC,Lef,Gold	15→15 (mg/日)	5.87→8.26 (mg/dl)	無効
13)40代 / 女 / 18年 / IV / 2	MTX	5→2.5 (mg/日)	5.60→0.21 (mg/dl)	著効(無効化)
14)70代 / 女 / 2年 / III / 2	MTX,BUC	10 →0 (mg/日)	1.51→0.10 (mg/dl)	著効(無効化)
15)70代 / 女 / 20年 / IV / 3	BUC,Gold,Az	5→0 (mg/日)	0.80→0.11 (mg/dl)	著効
16)60代 / 女 / 21年 / IV / 2	MTX	5→5 (mg/日)	1.02→0.15 (mg/dl)	有効
17)60代 / 男 / 6年 / III / 2	MTX,BUC,Lef	5→2.5 (mg/日)	2.53→0.06 (mg/dl)	著効(無効化)
18)60代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX,BUC,Lef	5 →0 (mg/日)	1.50→0.30 (mg/dl)	著効
19) 50代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX,SASP	10→5 (mg/日)	2.22→0.11 (mg/dl)	著効(無効化)
20) 50代 / 女 / 6か月 / II / 2	MTX	10→10 (mg/日)	7.20→6.00 (mg/dl)	無効
21) 50代 / 女 / 7年 / IV / 2	MTX	5→5 (mg/日)	0.86→0.13 (mg/dl)	有効
22) 50代 / 女 / 10年 / III / 2	MTX	10→5 (mg/日)	0.72→0.90 (mg/dl)	有効(無効化)
23) 60代 / 女 / 24年 / IV / 2	MTX	3→2 (mg/日)	0.36→0.03 (mg/dl)	著効(無効化)
24) 30代 / 男 / 1年 / IV / 2	MTX,エンブレル	5 →0 (mg/日)	4.76→0.10 (mg/dl)	著効(無効化)
25) 60代 / 女 / 9年 / III / 2	SASP,ヒュミラ	10→5 (mg/日)	5.33→0.49 (mg/dl)	有効(無効化)
26)60代 / 女 / 10年 / IV / 2	BUC,Gold	7.5→0.7 (mg/日)	4.25→0.02 (mg/dl)	著効
27)30代 / 女 / 3年 / II / 2	MTX,BUC	5→2.5 (mg/日)	0.94→0.01 (mg/dl)	著効
28)60代 / 女 / 5年 / III / 3	MTX,BUC	7.5→2.5 (mg/日)	6.77→0.06 (mg/dl)	著効(無効化)

年齢 / 性別 / 罹患年数 / Stage / Class	開始時点でのDMARD	PSL (開始前→後)	CRP (開始前→後)	効果判定
29)50代 / 女 / 6年 / III / 1	MTX	5→0 (mg/日)	不明→0.15 (mg/dl)	著効
30)40代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX	5→0 (mg/日)	0.45→0.10 (mg/dl)	著効
31)40代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX	0→0 (mg/日)	1.30→0.10 (mg/dl)	有効(無効化)
32)60代 / 女 / 3年 / III / 2	MTX, SASP	5→5 (mg/日)	0.10→0.12 (mg/dl)	無効
33)80代 / 女 / 2年 / IV / 2	オレンシア、MTX	0→0 (mg/日)	0.40→0.10 (mg/dl)	著効
34)40代 / 女 / 1年 / III / 2	MTX	5→5 (mg/日)	0.10→1.16 (mg/dl)	無効
35)70代 / 男 / 3年 / III / 2	MTX, SASP	7.5→2.5 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	著効
36)60代 / 女 / 2カ月 / I / 3	MTX	5→0 (mg/日)	0.80→0.10 (mg/dl)	著効
37)70代 / 女 / 6年 / III / 3	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	0.40→2.65 (mg/dl)	無効
38)40代 / 女 / 3年 / IV / 3	MTX	0→0 (mg/日)	6.10→0.25 (mg/dl)	有効
39)70代 / 女 / 13年 / III / 2	MTX、オレンシア	0→0 (mg/日)	0.46→0.12 (mg/dl)	有効
40)40代 / 女 / 11年 / IV / 2	アクテムラ、MTX、SASP	0→0 (mg/日)	0.10→0.10 (mg/dl)	著効(無効化)

MTX:メトレート、リウマトレックス、SASP:アザルフィジン、BUC:リマチル、Met:メタルカプターゼ、Ex:エンドキサン、Tac:プログラフ、Az:イムラン、CyA:ネオオーラル、Gold:シオゾール、Lef:アラバ、PSL:プレドニゾロン